



Ольга Довгопола,
кандидат медицинских наук,
член Американской
академии дерматологии

Ольга Довгопола

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НИЖНЕЙ ТРЕТИ ЛИЦА ПРИ ПОМОЩИ ПРЕПАРАТОВ КОМПАНИИ «АЛЛЕРГАН»

«Говорят, красота требует жертв...
Чушь! Красота требует денег!»

Карл Лагерфельд

С годами под силой гравитации, в связи с ослаблением мышечно-связочного аппарата, происходит смещение тяжёлой подкожной жировой прослойки вниз. Процесс затрагивает наиболее «мясистую», подверженную опущению часть — щёчно-скуловую область. Скорость появления проблемы зависит от характера распределения мягких тканей. Обладатели пышных форм лица страдают раньше. Кожа провисает сильнее. К 35-40 годам это становится заметным: обвисают щёки, формируются брыли, скулы становятся менее выраженными, появляются проблемы зоны рта. К 45-50 годам добавляется проблема западения щёк из-за естественного истончения жировой прослойки. Дополнительно возникает изменение зоны подбородка: формируются горизонтальные (полукруглые) морщины под нижней губой, кожа приобретает «булыжный» тип (становится бугристой), появляется провисание подбородка, нижней части лица. После 50-60 лет происходит усугубление имеющихся несовершенств: расширяется, углубляется сетка морщин, увеличивается объём провисания, дрябнет кожа.

Красоту лица определяют его пропорции. Принято считать, что расстояние от кончика носа до выступающего края нижней челюсти должно соответствовать высоте лба. Чётко обозначенный подбородок делает женское лицо более утончённым и подтянутым. Развитая нижняя часть лица у мужчин воспринимается как признак смелости и решительности. Однако идеальными пропорциями природа наделяет не всех. Гармонию нарушает невыраженная нижняя челюсть (слишком маленький подбородок не украшает ни женщин, ни мужчин) или чрезмерно массивный, квадратный подбородок (придаёт лицу тяжёловесный, грубый вид). Но всё это можно решить с помощью сочетанного применения препарата Ботокс® и филлера на основе гиалуроновой кислоты JUVEDERM® VOLUMA™. Ботокс® компании «Аллерган» производится в США, явля-

ется основоположником ботулинотерапии. Препарат средней силы действия, с мягким эффектом. Первые результаты видны на 4-5-е сутки после процедуры. Полноценный эффект виден через две недели. Период действия препарата составляет примерно 3-4 месяца.

В области нижней линии лица Ботокс® устраняет:

- носогубную, подбородочно-губную морщину, сглаживает глубину провисания;
- нарушенные контуры;
- завышенную (дёсенную) улыбку;
- морщинки в области рта.

Популярна процедура получения «улыбки Моны Лизы». С помощью токсина происходит расслабление мышц, подверженных гиперактивности. Результатом становится поднятие уголков губ, удержание участка от регресса. Процедура поможет устранить бугры, морщины в области нижней челюсти. Достигаются ровные контуры, более естественная картина натяжения кожи. Процедура ботокса также эффективна при гармонизации овала: борьбе с квадратобразной нижней челюстью, острым выступающим подбородком.

Инъекции препарата Ботокс® помогут скорректировать овал, убрать брыли, очертить нижнечелюстную границу. Манипуляция называется «подтяжка Нефертити». Инъекции ботулотоксина в жевательные мышцы способствуют сужению овала. Контуры становятся более чёткими, выделяются скулы, лицо приобретает изящные очертания. Эта процедура популярна не только у возрастных дам, но и у молодых девушек с массивными формами.

Какие вопросы решает Ботокс® на подбородке?

Специфические проблемы, которые служат показанием для применения ботулотоксинов, связаны с коррекцией препаратом Ботокс® морщин подбородка, вызванных гипертонусом мышц.

Морщины под нижней губой

Подбородочная мышца управляет движением нижней губы, обеспечивает плотное прижатие к верхней губе. Чрезмерное напряжение мышцы подтягивает кожу, а сложившаяся мимическая привычка формирует складку, полукругом отделяющую подбородок. Проявляется она с возрастом, однако это мимическая морщинка, с которой эффективно борется Ботокс®.

«Булыжный подбородок»

Специфическая мимическая особенность, проявляющаяся у ряда женщин. При напряжении подбородочной мышцы (например, улыбке) на коже появляются неровности, бугорки. Причина «булыжного подбородка» — чрезмерно активная работа подбородочной мышцы.

Не всем нужна ментопластика, то есть пластическая хирургия, простая коррекция подбородка филлерами (наполнителями) способна решить многие эстетические проблемы без операции. Введение филлера в область челюсти позволяет сделать эту часть лица более выраженной или создать более мягкие контуры, если от природы подбородок сильно заострён. JUVEDERM® VOLUMA™ — филлер, основой которого также служит стабилизированная гиалуроновая кислота. Гель очень плотный и более твёрдый по сравнению с другими наполнителями. Филлер даёт прекрасный эстетический эффект — равномерно распределяется, позволяет добиваться естественных и гармоничных форм лица. В его состав входит лидокаин, который обеспечивает безболезненное и комфортное введение. Результат сохраняется до двух лет.




Показания

Слишком маленький подбородок; асимметрия; желание убрать ямочку или другие неровности; некрасивая форма (квадратная, слишком заострённая и т. д.); прочие несовершенства этой части лица.

Улучшение овала лица с помощью инъекции препарата Ботокс® в жевательные мышцы

Жевательная мышца — это довольно крупная мышца, расположенная в нижней трети лица. Она берёт своё начало в области скуловой кости, а другим своим концом крепится к углу нижней челюсти. Её основная функция — это подъём нижней челюсти, а ещё она участвует в формировании контуров нижней трети лица. Жевательная мышца является одной из самых сильных мышц в человеческом теле.

Гипертрофия жевательной мышцы — это увеличение её в объёме. По мере увеличения объёма жевательных мышц происходит расширение лица книзу, оно приобретает квадратную либо треугольную форму, углубляются носогубные и губоподбородочные складки, опускаются уголки рта — формируется массивная нижняя треть лица. Процедура позволяет эффективно решить эту проблему. Препарат действует на уровне контакта окончания нерва с мышцей, где блокирует выделение ацетилхолина, кото-



рый обеспечивает сокращение мышцы, в результате чего мышца частично не участвует в движении, а когда мышца меньше сокращается, она уменьшается в объёме. Визуально это приводит к изменению формы лица, оно становится более узким, овальным, подтягиваются нижние контуры лица. Черты лица становятся более мягкими, женственными и привлекательными.

Итак, комбинируя эти методики, можно добиться достаточно выраженного результата и омоложения нижней трети лица нехирургическими методами.

Искренне ваша,
Ольга Довгопола



Киев, ул. Институтская, 16
офис 32
тел.: (067) 217-08-08
(095) 096-30-06
www.olga-beauty.com
Instagram: dr.dovgopola